

Research Article

Ants of the subfamily (Formicidae: Myrmicinae) in the western half of Kermanshah province and report of a new species for Iran

Maryam Jang Zargari, Shahrokh Pashaei Rad *

Department of Animal Science and Biotechnology, Faculty of Bioscience and Technology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Key Words

Hymenoptera
Formicidae
Biological index
Biodiversity
Kermanshah
Environmental conditions

Abstract

Introduction: Ants are social insects that belong to the Hymenoptera order and the Formicidae family. Ants have an important and effective function in ecological processes and environmental changes and show sensitivity to environmental changes. In recent years, this family of insects is used as a biological indicator in many countries.**Materials & Methods:** In order to investigate the fauna and biodiversity of ants in the western half of Kermanshah Province, sampling was done from 15 different stations during 1401-1402. The collected samples were identified in the laboratory using valid identification keys.**Results:** The results of this research led to the identification of 13 species from 6 genera of the Myrmicinae subfamily, which are:*Aphanogaster obsidiana* (Mayr, 1861)*Crematogaster antaris* (Forel, 1849), *C. oasium* (Santschi, 1911), *C. sp.* (Lund, 1831)*Leptothorax sp.* (Mayr, 1855)*Messor caducus* (Victor, 1839), *M. capitatus* (Latreille, 1798), *M. dentatus* (Santschi, 1927),*M. denticulatus* (Santschi, 1927)*Monomorium pharaonic* (Linnaeus, 1758)*Pheidole megacephala* (Fabricius, 1793), *P. minuscula* (Bernard, 1953), *P. Pallidula* (Nyland 1849)The species *Pheidole minuscula* is reported for the first time from Iran.**Conclusion:** The findings of this research reveal that, the most of ants show high adaptability in different environmental conditions. *Pheidole minuscula* is reported for the first time from Iran.

Article info

* Corresponding Author's email:
shprad50@gmail.com

Received: 29 October 2024

Reviewed: 29 November 2024

Revised: 29 January 2025

Accepted: 1 March 2025

مقاله علمی - پژوهشی

مورچه‌های زیرخانواده (Formicidae: Myrmicinae) در نیمه غربی استان کرمانشاه و گزارش یک گونه جدید برای ایران

مریم جنگ‌زرگری، شاهرخ پاشائی‌راد*

گروه علوم و زیست فناوری جانوری، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه: مورچه‌ها حشراتی اجتماعی هستند که به راسته بال‌غشائیان (Hymenoptera) و خانواده Formicidae تعلق دارند. مورچه‌ها دارای عملکردی مهم و موثر در فرایندهای اکولوژیک و تغییرات محیطی هستند و نسبت به تغییرات محیطی حساسیت نشان می‌دهند. در طی سال‌های اخیر این خانواده از حشرات، به‌عنوان شاخص زیستی در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است.

بال‌غشاییان
Formicidae
شاخص زیستی
تنوع گونه‌ای
کرمانشاه
شرایط محیطی

مواد و روش‌ها: به منظور بررسی مورچه‌ها در نیمه غربی استان کرمانشاه نمونه‌برداری از ۱۵ ایستگاه مختلف طی سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۲ انجام گرفت. نمونه‌های جمع‌آوری شده در آزمایشگاه با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند.

نتایج: حاصل این تحقیق منجر به شناسایی ۱۳ گونه از شش جنس از زیر خانواده Myrmicinae گردید که عبارتند از:

- Aphanogaster obsidiana* (Mayr, 1861)
Crematogaster antaris (Forel, 1849), *C. oasium* (Santschi, 1911), *C. sp.* (Lund, 1831)
Leptothorax sp. (Mayr, 1855)
Messor caducus (Victor, 1839), *M. capitatus* (Latreille, 1798), *M. dentatus* (Santschi, 1927),
M. denticulatus (Santschi, 1927)
Monomorium pharaonic (Linnaeus, 1758)
Pheidole megacephala (Fabricius, 1793), *P. minuscula* (Bernard, 1953), *P. Pallidula* (Nylander, 1849)

گونه *Pheidole minuscula* برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های این تحقیق بیانگر آن است که بیش‌تر مورچه‌ها سازگاری بالایی را از خود در محیط‌های مختلف نشان می‌دهند.

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

shprad50@gmail.com

تاریخ دریافت: ۸ آبان ۱۴۰۳

تاریخ داوری: ۹ آذر ۱۴۰۳

تاریخ اصلاح: ۱۰ بهمن ۱۴۰۳


تاریخ پذیرش: ۱۱ اسفند ۱۴۰۳

مقدمه

مواد و روش‌ها

استان کرمانشاه با مساحت ۲۴۶۴۰ کیلومتر مربع، هفدهمین استان ایران از نظر وسعت به‌شمار می‌رود. این استان در موقعیت ۳۴ درجه شرقی و ۴۷ درجه شمالی قرار دارد (شکل ۱). استان کرمانشاه دارای آب و هوای متنوع و حدود ۷۷۰ چشمه و ۷۴ حوضچه است. این استان از نظر کشاورزی در تولید محصولات ماندگندم و ذرت دارای اهمیت به‌سزایی است. در تحقیق حاضر که طی سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۲ انجام گرفت نیمه غربی این استان را به ۱۵ ایستگاه مطالعاتی براساس شرایط اکولوژیک متفاوت به نام‌های پارک شرقی، پارک غربی، شکارگاه خسروپرویز، دریاچه مصنوعی و تاسیسات شرکت نفت، باغ چقاگلان، باغ فردوس، جنگل‌های مصنوعی ارغوان، پارک جلالیه، منابع طبیعی استان، مجتمع علوم پزشکی رازی، نیروگاه برق، پارک شیرین، کارخانه آرد بیستون، رودخانه قره‌سو و قلعه کهنه تقسیم کرده و نمونه برداری از آن‌ها طی ۳ فصل بهار، تابستان و پاییز به‌روش دستی صورت گرفت (جدول ۱). نمونه‌های جمع‌آوری شده پس از انتقال به کرال تیوپ‌های حاوی الکل ۷۰٪، در آزمایشگاه بیوسیستماتیک دانشگاه شهید بهشتی به‌وسیله استریومیکروسکوپ و کلیدهای شناسایی معتبر مثل (Balkan (1987) و Collingwood (1996)، Bolton (1994) تا حد جنس و گونه مورد شناسایی قرار گرفتند.

مورچه‌ها در تمامی قاره‌ها به‌جز قطب جنوب و چند جزیره بزرگ هم چون گرین‌لند، ایسلند، بخش‌هایی از پلی‌نزی و جزایر هاوایی وجود دارند. این حشرات ۱۵ تا ۲۰ درصد از توده جانوران خشکی را به خود اختصاص داده‌اند (۱). از این خانواده تاکنون نزدیک به ۱۳۰۰۰ گونه شناسایی و گزارش شده است (۲). مورچه‌ها همزیستی گسترده‌ای با جانوران و گیاهان دارند (۳). آن‌ها می‌توانند در کنترل بیولوژیک آفات، جابه‌جایی خروارها خاک و چرخه مواد غذایی نقش مهمی را ایفا کنند (۳). تنوع مکانی مورچه‌ها بسیار زیاد بوده و این تنوع با ساختار جمعیتی مورچه‌ها در ارتباط است (۴). مطالعات زیادی در سایر کشورها بر روی مورچه‌ها صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به مطالعات Emery در سال ۱۹۰۷ فون مورچه‌های ایتالیا (۵)، Menozzi در سال ۱۹۲۷ فون مورچه‌های کاستاریکا (۶)، Tarbinsky در سال ۱۹۷۶ فون مورچه‌های قرقیزستان (۷)، Terayama در سال ۱۹۹۴ فون مورچه‌های توکیو (۸) اشاره نمود، در مقایسه مطالعات انجام شده در ایران به‌صورت محدود و پراکنده بوده که عبارتند از: Ardeh در سال ۱۳۷۳ از کرج (۹)، Paknia در سال ۱۳۷۸ در تنوع گونه‌ای مورچه‌های ایران (۱۰)، Paknia و همکاران در سال ۱۳۸۹ تهیه چک لیستی از مورچه‌های ایران (۱۱)، Parsa در سال ۱۳۹۱ از استان مازندران (۱۲)، Aram در سال ۱۳۹۴ از استان اردبیل (۱۳)، Ghahari و Collingwood در سال ۱۳۹۵ از شمال و جنوب ایران (۱۴) و Ghahari و همکاران در سال ۱۳۹۵ از استان مازندران (۱۵) اشاره کرد.



شکل ۱: نیمه‌های شرقی و غربی استان کرمانشاه (last second.ir)

زیرخانواده Myrmicinae (Fargeau, 1835): بیشتر اعضا

دارای چشم‌های مرکب، کارگرها فاقد چشم‌های ساده؛ شاخک‌ها ۴ تا ۱۲ بندی؛ معمولاً واجد لوب‌های جلویی پیشانی؛ ناحیه کلایپیوس امتداد یافته تا بین برآمدگی‌های جلوی صورت؛ واجد پتیول و پتیول عقبی؛ منفذ غدد متاپلئورال غالباً مخفی و یا فاقد آن؛ پیژیديوم در اندازه‌های مختلف؛ انتهای شکم واجد نیش.

جنس *Messor* (Forel, 1890): زیرگلو در بسیاری از گونه‌ها

واجد موهای بلند خمیده؛ شاخک‌ها ۱۲ بندی، ۳ بند انتهایی شاخک‌ها بزرگ‌تر از بندهای قبلی؛ آرواره‌ها پهن؛ شکم از نمای بالا گلابی شکل؛ اغلب گونه‌های چندشکلی؛ پتیول عقبی متصل به ناحیه جلویی میانی بند اول شکم. ۴ گونه از این جنس برای ایران شناسایی شده‌است.

گونه *Messor dentatus* (Santschi, 1927): بدن کاملاً به رنگ

قرمز تیره مایل به سیاه براق و با نقش و نگارهای مشخص؛ پهنای سر بیشتر از یک میلی‌متر، سطح زیرین سر با موهای کوتاه و خمیده، ناحیه پس سر حداقل با شش تار مو در هر طرف؛ اولین بند ناحیه فونیکولوس شاخک‌ها بلندتر و پهن‌تر از بند دوم؛ بدن با موهای کوتاه و بلند فراوان؛ خار ساق پاهای میانی و عقبی از نوع ساده؛ ناحیه پروپودئوم زاویه‌دار (شکل ۲).

بیولوژی: این گونه سازگاری بیشتر با مناطق سبز و گل و گیاه دارد (www.antwiki.org).

مشخصات جمع‌آوری: این گونه از ایستگاه‌های باغ فردوس به تعداد

۷ نمونه، پارک شیرین ۴ نمونه، کارخانه آرد بیستون ۳ نمونه، پارک جلالیه ۵ نمونه و نیروگاه برق ۶ نمونه جمع‌آوری گردید.

پراکنش: ترکیه و فلسطین اشغالی (www.antwiki.org) و ایران (مطالعه حاضر)

جدول ۱: مشخصات ایستگاه‌های نمونه‌برداری

ارتفاع از سطح دریا	عرض جغرافیایی	طول جغرافیایی	ایستگاه‌های نمونه‌برداری
۱۳۳۰	۳۴.۳۸۴۱۹۱	۴۷.۱۳۷۴۶۹	پارک شرقی
۱۳۵۲	۳۴.۳۸۸۷۹۷	۴۷.۱۲۷۴۵۵	پارک غربی
۱۳۰۴	۳۴.۳۷۷۴	۴۷.۱۲۷۳	شکارگاه خسرو پرویز دریاچه مصنوعی یا رودخانه چم بشیر و تاسیسات شرکت نفت
۱۳۱۴	۳۴.۳۸۴۴۵۷	۴۷.۱۲۹۲۶۵	باغ چقاگلان
۱۳۰۷	۳۴.۳۵۶۵۷۹	۴۷.۰۸۷۰۶۵	باغ فردوس
۱۳۶۳	۳۴.۳۱۴۳۳۷	۴۷.۰۸۹۶۵۹	جنگل‌های مصنوعی ارغوان
۱۵۸۳	۳۴.۳۶۵۷۵۶	۴۷.۲۳۲۰۳۰	پارک جلالیه
۱۳۱۱	۳۴.۳۶۵۷۵۶	۴۷.۲۳۲۰۳۰	اداره منابع طبیعی استان
۱۳۱۳	۳۴.۳۲۶۶۰۸	۴۷.۱۰۹۲۵۷	پارک شیرین
۱۴۱۶	۳۴.۳۱۱۸۳۵	۴۷.۰۶۰۸۹۰	نیروگاه برق
۱۳۱۱	۳۴.۳۴۶۱۵۸	۴۷.۳۵۴۷۱۲	کارخانه آرد بیستون
۱۳۰۴	۳۴.۳۴۴۷۳۴	۴۷.۲۸۶۸۴۱	رودخانه قره‌سو
۱۲۹۶	۳۴.۳۳۳۶۴۱	۴۷.۱۲۷۹۱۳	قلعه کهنه
۱۳۲۶	۳۴.۳۳۸۲۴۷	۴۷.۰۸۰۰۱۰	مجتمع علوم پزشکی رازی
۱۳۴۵	۳۴.۳۸۹۶۳۲	۴۷.۱۱۲۶۷۱	

نتایج

در مطالعه حاضر ۱۳ گونه از ۶ جنس از زیرخانواده Myrmicinae مورد شناسایی قرار گرفت.



شکل ۲: گونه *Messor dentatus* الف: سر از نمای بالا، ب: بدن از نمای جانبی (نگارنده)

سر با موهای کم یا بدون مو، سطح شکمی سر با موهای متعدد کوتاه (شکل ۳).

بیولوژی: این گونه بیشتر سازگاری با مناطق خشک بیابانی دارد (www.antwiki.org).

گونه *Messor capitatus* (Latreille, 1798): شکم دارای مو؛

پاها روشن‌تر از بدن؛ پروپودئوم زاویه‌دار و با دو برجستگی؛ سینه دارای موهای پراکنده؛ فاقد چشم‌های ساده؛ شاخک‌ها ۱۲ بندی؛ پتیول عقبی متصل به سطح جلویی میانی بند اول شکم؛ دو طرف

پراکنش: فرانسه، ایتالیا و اسپانیا (www.antwiki.org) و ایران (مطالعه حاضر)

مشخصات جمع‌آوری: این گونه از نیروگاه برق به تعداد ۴ نمونه، باغ فردوس ۷ نمونه، شرکت نفت ۳ نمونه و منابع طبیعی استان ۶ نمونه جمع‌آوری شد.



شکل ۳: گونه *Messor capitatus* الف: سر از نمای بالا، ب: بدن از نمای جانبی (نگارنده)

بیولوژی: سازگاری این گونه بیشتر با مناطق مرطوب جنب رودخانه‌ها و باغات اطراف رودخانه است (www.antwiki.org).
مشخصات جمع‌آوری: این گونه از زیستگاه‌های باغ چقاگلان به تعداد ۷ نمونه، رودخانه قره‌سو ۲ نمونه، قلعه کهنه ۴ نمونه، پارک شیرین ۳ نمونه و باغ فردوس ۷ نمونه جمع‌آوری شد.
پراکنش: اسپانیا (www.antwiki.org) و ایران (مطالعه حاضر)

گونه *Messor denticulatus* (Santschi, 1927): بدن دورنگ، سر و شکم قهوه‌ای مایل به سیاه، سینه روشن‌تر، بدن براق و با نقش و نگارهای سطحی؛ پهنای سر بیشتر از یک میلی‌متر، سطح زیرین سر با موهای کوتاه و خمیده، ناحیه پس سر حداقل با شش تار مو در هر طرف؛ اولین بند فونیکولوس شاخک‌ها بلندتر و پهن‌تر از بند دوم؛ سطح بدن با موهای کوتاه و بلند فراوان؛ پاهای میانی و عقبی فاقد خار؛ ناحیه پروپودئوم زاویه‌دار (شکل ۴).



شکل ۴: گونه *Messor denticulatus* الف: سر از نمای بالا، ب: بدن از نمای جانبی (نگارنده)

بیولوژی: این گونه بیشتر با مناطق گرم و خشک سازگاری دارد (www.antwiki.org).
مشخصات جمع‌آوری: این گونه از زیستگاه‌های باغ فردوس به تعداد ۴ نمونه و منابع طبیعی ۶ نمونه جمع‌آوری گردید.
پراکنش: ارمنستان، آذربایجان و ترکیه (www.antwiki.org) و ایران (مطالعه حاضر)

گونه *Messor caducus* (Victor, 1839): بدن دورنگ، سر و شکم قهوه‌ای مایل به سیاه، سینه قهوه‌ای، بدن براق و با نقش و نگارهای سطحی ضعیف؛ پهنای سر بیشتر از یک میلی‌متر، سطح زیرین سر با موهای بلند و خمیده، ناحیه پس سر حداقل با شش تار مو در هر طرف؛ اولین بند ناحیه فونیکولوس شاخک‌ها بلندتر و پهن‌تر از بند دوم؛ بدن با موهای کوتاه و بلند فراوان؛ خار ساق پاهای میانی و عقبی ساده؛ پروپودئوم زاویه‌دار (شکل ۵).



شکل ۵: گونه *Messor caducus* الف: سر از نمای بالا، ب: بدن از نمای جانبی (نگارنده)

متصل به سطح پشتی بند اول شکم؛ شاخک‌ها ۱۲ بندی، بند آخر شاخک‌ها بلندتر از دو بند قبلی؛ فاقد چشم‌های ساده (شکل ۶). بیولوژی: این گونه بیشتر سازگار با باغات، جنگل‌ها و مناطق مرطوب می‌باشد (www.antwiki.org).

مشخصات جمع‌آوری: این گونه از زیستگاه‌های باغ چقاگلان به تعداد ۲ نمونه و جنگل‌های مصنوعی ارغوان ۳ نمونه جمع‌آوری شد.

جنس (*Crematogaster* (Lund, 1831): ۳ بند انتهایی شاخک بزرگ‌تر از بندهای قبلی، پتیول عقبی متصل به سطح پشتی میانی بند اول شکم؛ شکم از نمای بالا قلبی شکل؛ گونه‌های تهاجمی؛ انتهای شکم دارای نیش. از این جنس ۳ گونه شناسایی گردیده است.

گونه (*Crematogaster* sp. (Lund, 1831): سر قهوه‌ای روشن همراه با موهای خوابیده ریز؛ سینه به رنگ قهوه‌ای تیره؛ شکم به رنگ قهوه‌ای مایل به مشکی و قلبی شکل؛ پتیول عقبی (Post petiol)



شکل ۶: گونه *Crematogaster* sp. الف: سر از نمای بالا، ب: بدن از نمای جانبی (نگارنده)


بیولوژی: این گونه سازگار با منطقه‌ای با رطوبت بسیار بالا می‌باشد (www.antwiki.org).

مشخصات جمع‌آوری: این گونه از زیستگاه رودخانه قره‌سو به تعداد ۶ نمونه جمع‌آوری شد.

پراکنش: کویت (www.antwiki.org) و ایران (مطالعه حاضر)

گونه (*Crematogaster oasium* (Santschi, 1911): بدن دورنگ،

سر و شکم به رنگ قهوه‌ای تیره، شکم مایل به سیاه، آلترانک و پاها قهوه‌ای روشن؛ عرض سر تقریباً برابر با طول آن، سطح پشتی سر با زوائد مویی فراوان؛ حاشیه جلویی کلایپئوس با موهای پراکنده و بلند؛ خارهای پروپودئوم بسیار کوتاه؛ پتیول عقبی دو لبی؛ سطح پشتی و زیرین شکم با موهای فراوان (شکل ۷).



شکل ۷: گونه *Crematogaster oasisium* الف: سر از نمای بالا، ب: بدن از نمای جانبی (نگارنده)

مشخصات جمع‌آوری: این گونه از زیستگاه‌های پارک شیرین به تعداد ۷ نمونه، جنگل‌های مصنوعی ارغوان ۳ نمونه و نیروگاه برق ۲ نمونه جمع‌آوری شد.
پراکنش: عربستان، یمن و عمان (www.antwiki.org) و ایران (مطالعه حاضر)

گونه *Crematogaster antaris* (Forel, 1849): عرض سر تا حدودی برابر با طول آن؛ بدن با زوائد مویی فراوان؛ خارهای پروپودئوم بسیار کوتاه؛ پتیول عقبی دو لبی؛ سطح پشتی و زیرین شکم با موهای فراوان؛ حاشیه جلویی کلایپوس با موهای پراکنده و بلند؛ عرض پتیول تقریباً برابر با ارتفاع آن (شکل ۸).
بیولوژی: این گونه بیشتر در نواحی سرسبز و زمین‌های کشاورزی مثل گندم و جو پراکنده می‌باشد (www.antwiki.org).



شکل ۸: گونه *Crematogaster antaris* الف: سر از نمای بالا، ب: بدن از نمای جانبی (نگارنده)

بندهای دوم، سوم و چهارم ناحیه فونیکولوس شاخک‌ها چهار گوش؛ سطح پشتی سر تا بالای چشم‌ها فاقد شیار (شکل ۹).
بیولوژی: این گونه پراکندگی وسیع داشته و در مناطق سرسبز، خشک و بیابانی پراکنده دارد (www.antwiki.org).
مشخصات جمع‌آوری: این گونه از زیستگاه‌های کارخانه آرد بیستون به تعداد ۵ نمونه، پارک غربی ۴ نمونه و پارک شرقی ۵ نمونه جمع‌آوری گردید.
پراکنش: عربستان، ایسلند و کنیا (www.antwiki.org) و ایران (مطالعه حاضر)

جنس *Pheidole* (Westwood, 1839): گونه‌های چند شکلی؛ شاخک‌ها ۱۲ بندی، ۳ بند انتهایی شاخک‌ها بزرگ‌تر از بندهای قبل؛ پروپودئوم واجد خار یا زوائد دندان‌شکل؛ کارگرهای کوچک واجد آرواره‌هایی با بیش از ۳ دندان، آرواره‌های کارگرهای بزرگ با ۳ دندان؛ چشم‌های مرکب نسبتاً کوچک. از این جنس ۳ گونه شناسایی گردیده است.

گونه *Pheidol megacephala* (Fabricius, 1793): بدن به رنگ قهوه‌ای، بدن با موهای نسبتاً بلند و تعداد کم؛ گونه‌های بزرگ و کوچک؛ حاشیه دو طرف سر خمیده؛ پتیول فاقد زائده‌ی شکمی؛

سر تقریباً خمیده؛ پتیول فاقد زائده شکمی؛ پروپودئوم خاردار؛ سطح پشتی سر تا بالای چشم‌ها فاقد شیار؛ قسمت جلویی ناحیه میان قفسه سینه صاف و فاقد برآمدگی (شکل ۱۰). این گونه برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردد.

بیولوژی: این گونه سازگاری با مناطق بسیار مرطوب دارد (www.antwiki.org).

مشخصات جمع‌آوری: این گونه از زیستگاه رودخانه قره‌سو به تعداد ۴ نمونه جمع‌آوری شد.

پراکنش: عراق و فلسطین اشغالی (www.antwiki.org) و ایران (مطالعه حاضر)



شکل ۹: گونه *Pheidole megacephala* سر و بدن از نمای بالا (نگارنده)

گونه *Pheidole minuscula* (Bernard, 1953): رنگ بدن زرد، شکم تا حدودی قهوه‌ای؛ بدن با موهای کوتاه فراوان؛ حاشیه دو طرف



شکل ۱۰: گونه *Pheidole minuscula* الف: سر از نمای بالا، ب: بدن از نمای جانبی (نگارنده)

بیولوژی: این گونه سازگار با نواحی مرطوب و سرسبز می‌باشد (www.antwiki.org).

مشخصات جمع‌آوری: این گونه در زیستگاه‌های رودخانه قره‌سو به تعداد ۵ نمونه و پارک شیرین ۴ نمونه شناسایی گردید.

پراکنش: افغانستان، آلبانی، ارمنستان، فلسطین اشغالی و ایتالیا (www.antwiki.org) و ایران (مطالعه حاضر)

گونه *Pheidole pallidula* (Nylander, 1849): رنگ بدن زرد و قهوه‌ای بسیار روشن؛ در هر دو فرم بزرگ و کوچک بندهای دوم، سوم و چهارم فونیکولوس شاخک‌ها چهارگوش؛ آرواره‌های افراد بزرگ پهن و با ۳ دندان مشخص، آرواره‌های افراد کوچک باریک و سه گوش و دارای تعدادی دندان کوچک؛ قسمت جلویی ناحیه میان قفسه سینه مسطح؛ ناحیه پروپودئوم در هر دو فرم بزرگ و کوچک فاقد خار یا دارای خارهای بسیار کوچک (شکل ۱۱).



شکل ۱۱: گونه *Pheidole pallidula* الف: سر از نمای بالا، ب: بدن از نمای جانبی (نگارنده)

موهای ایستاده فراوان؛ سطح پشتی پتیول و پتیول عقبی با زوائد مویی (شکل ۱۲).

بیولوژی: این گونه سازگار با مناطق کوهستانی با رطوبت نسبتاً کم می‌باشد (www.antwiki.org).

مشخصات جمع آوری: این گونه از زیستگاه‌های پارک شرقی به تعداد ۷ نمونه و پارک غربی ۵ نمونه جمع‌آوری شد.

پراکنش: آذربایجان، فلسطین اشغالی و ترکیه (www.antwiki.org) و ایران (مطالعه حاضر)

جنس *Aphanogaster* (Mayr, 1798): طول سربیشتر از عرض

آن؛ ۳ بند انتهایی شاخک‌ها بزرگ‌تر از بندهای قبلی، شاخک‌ها ۱۲ بندی؛ آرواره‌ها مثلثی شکل؛ پتیول عقبی متصل به ناحیه جلویی میانی بند اول شکم، شکم گلابی شکل.

گونه *Aphanogaster obsidiana* (Mayr, 1861): بدن به رنگ

سیاه، بدن به ویژه شکم براق، سر و سینه با نقش و نگارهای کاملاً مشخص؛ اسکپ شاخک‌ها فراتر از پس سر؛ سطح پشتی پروپودئوم حداقل با ۲ جفت تار مو، پروپودئوم خاردار؛ سطح پشتی شکم با



شکل ۱۲: گونه *Aphanogaster obsidiana* الف: سر از نمای بالا، ب: بدن از نمای جانبی (نگارنده)

عقبی متصل به سطح جلویی میانی بند اول شکم؛ بدن با موهای پراکنده؛ شاخک‌ها ۱۲ بندی؛ چشم‌های ساده کروی شکل (شکل ۱۳).

بیولوژی: این گونه سازگاری با مناطق کشاورزی و باغات با رطوبت متوسط و آب و هوای سرد دارد (www.antwiki.org).


مشخصات جمع آوری: این گونه از زیستگاه‌های باغ چقاگلان به تعداد ۴ نمونه، کارخانه آرد بیستون ۵ نمونه، پارک جلالیه ۵ نمونه و مجتمع علوم پزشکی رازی ۸ نمونه شناسایی گردید.

جنس *Leptothorax* (Mayr, 1855): گونه‌های تقریباً یک اندازه

و یک شکل؛ شاخک‌ها ۱۲ بندی، ۴ یا ۵ بند انتهایی شاخک‌ها بزرگ‌تر از بندهای قبلی؛ چشم‌های ساده کروی شکل؛ پتیول عقبی نسبتاً بزرگ؛ آرواره‌ها با ۵ دندان؛ سطح پشتی آلترانک واجد موهای ایستاده؛ پروپودئوم خاردار. ۱ گونه از این جنس مورد شناسایی قرار گرفت.

گونه *Leptothorax sp.* (Mayr, 1855): سر و شکم به رنگ

سیاه؛ پروپودئوم با خارهای ریز؛ دارای پتیول و پتیول عقبی، پتیول



شکل ۱۳: گونه *Leptothorax sp.* الف: سر از نمای بالا، ب: بدن از نمای جانبی (نگارنده)

گونه *Monomorium pharaonis* (Linnaeus, 1758): ناحیه

سر، سینه و پاها به رنگ زرد؛ شکم سیاه تیره؛ بدن براق؛ ناحیه سر با نقوش مشبک بسیار کوچک، حاشیه قدامی سر فاقد خطوط طولی؛ اندازه بند انتهایی شاخک‌ها تقریباً دو برابر مجموع دو بند قبلی؛ نواحی سر، سینه و پتیول با یک جفت تار مو؛ پتیول هم اندازه با


جنس *Monomorium* (Mayr, 1855): شاخک‌ها ۱۲ بندی، ۴

یا ۵ بند انتهایی شاخک‌ها بزرگ‌تر از بندهای قبلی؛ چشم‌های مرکب کروی و کوچک؛ پروپودئوم فاقد خار؛ پتیول عقبی متصل به ناحیه جلویی میانی بند اول شکم؛ شکم از نمای بالا گلابی شکل. ۱ گونه از این جنس مورد شناسایی قرار گرفت.

پتیول عقبی؛ خار ساق پاهای میانی و عقبی ساده؛ شیار متانوتال مشخص (شکل ۱۴).

بیولوژی: این گونه سازگاری زیادی با نواحی خشک و بیابانی دارد (www.antwiki.org).

مشخصات جمع‌آوری: این گونه از زیستگاه‌های نیروگاه برق به تعداد ۵ نمونه، قلعه کهنه ۵ نمونه، پارک شرقی ۷ نمونه و منابع طبیعی استان ۴ نمونه جمع‌آوری گردید.
پراکنش: کامرون، کنیا و استرالیا (www.antwiki.org) و ایران (مطالعه حاضر)



شکل ۱۴: گونه *Monomorium pharaonis* الف: سر از نمای بالا، ب: بدن از نمای جانبی (نگارنده)

بحث

شهرستان سبزوار (۱۸)، Abolfathi، از شهرستان بروجرد (۱۹) در کنار گیاهان خانواده Capparidaceae شناسایی کرده‌اند، که دلالت بر سازگاری آن با مناطق مختلف با آب و هوای متفاوت دارد. گونه *Monomorium pharaonis* از مناطق بیابانی و خشک جمع‌آوری گردید. اعضای جنس *Monomorium* گونه‌های گرم‌پسند محسوب می‌شوند. در بررسی نتایج حاضر ایستگاه‌هایی که در مناطق بیابانی با دمای بالا و رطوبت کم قرار دارند کمترین تعداد و تنوع گونه‌ای را داشته در حالی که ایستگاه‌هایی مانند باغات و مزارع کشاورزی بیشترین پراکنش را نشان داده‌اند. ایستگاه‌های حاشیه رودخانه قره‌سو، به دلیل داشتن آب و هوای معتدل تر نسبت به مناطق اطراف و کشت و کار کشاورزی بیشترین تنوع گونه‌ای را به ثبت رسانده‌اند. در مطالعه حاضر گونه *Pheidole minuscula* برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردد و تا کنون گزارشی از آن صورت نگرفته است.

منابع

1. Firouzi, F., Pashaei Rad, Sh., Hossein Nezhad, S. and Agosti, D., 2011. Four new records of ants from Iran: (Hymenoptera: Formicidae). *Zoology in the Middle East*. 52(1): 71-78. doi: 10.1080/09397140.2011.10638481
2. Bronstein, J., 2009. The evolution of facilitation and mutualism. *Journal of Ecology*. 97(6): 1160-1170. doi: 10.1111/j.1365-2745.2009.01566.x
3. Torabi, R., 2014. Study of fauna and genetic diversity of ants (Hymenoptera: Formicidae) in Shiraz city and suburbs, master's thesis, animal biosystematics, faculty of biological sciences, Shahid Beheshti University. (In Persian)

تنوع و پراکنندگی مورچه‌ها بستگی به فاکتورهای محیطی از جمله طول و عرض جغرافیایی، پوشش گیاهی و رطوبت دارد. در این مطالعه جنس *Messor* با ۴ گونه دارای تنوع گونه‌ای بالایی می‌باشد. گونه‌های این جنس غالباً دانه خوار بوده و به مورچه‌های دروگر معروف هستند. در استان کرمانشاه مزارع، باغ‌های میوه، گیاهان علفی، دارویی و زینتی فراوانی وجود دارد که منبع غذایی برای اعضای این جنس را فراهم آورده و تنوع بالای گونه‌های اعضای این جنس را توجیه می‌کند. این گونه‌ها توسط Heydari Kia از مناطق گرم و خشک کویری قم گزارش شده (۱۶) در حالی که در تحقیق حاضر این گونه‌ها از ایستگاه‌های باغ فردوس، پارک شیرین، کارخانه آرد بیستون، پارک جلالیه، نیروگاه برق، شرکت نفت، منابع طبیعی استان، باغ چقاگلان، رودخانه قره‌سو و قلعه کهنه نزدیک به رودخانه و رطوبت بالا جمع‌آوری گردیده‌اند که بیانگر سازگاری این گونه با شرایط مختلف اکولوژیکی است. گونه‌های *M. denticulatus* و *M. denticulatus* از بیشتر ایستگاه‌های مورد نمونه برداری جمع‌آوری شدند. گونه *M. denticulatus* را Jafari از اکثر ایستگاه‌های منطقه کوهستانی شهرستان مشگین شهر استان اردبیل شبیه به کرمانشاه با میانگین رطوبت ۳۰ درصد و ارتفاع بین ۱۱۲۰ تا ۱۷۰۰ متر با آب و هوای معتدل کوهستانی و سرد گزارش نمود (۱۷). گونه *Pheidole pallidola* در ۲ ایستگاه مورد شناسایی قرار گرفت. این ایستگاه‌ها دارای رطوبت بسیار بالا بودند. همین گونه را Nafisi، از

4. **Rizali, A., Bos, M., Buchori, D., Yamane, S. and Schulze, C.H.A., 2008.** Ants in Tropical Urban Habitats: The Myrmecofauna in a Densely Populated Area of Bogor, West Java, Indonesia. *HAYATI Journal of Biosciences*. 15(2): 77-84. doi: 10.4308/hjb.15.2.77
5. **Emery, C., 1906.** Rassegna critica delle specie palearticole de genere Myrmecocystus. Memarie dell Reale Accademia delle Scienze dell Istituto di Bologna. 28 p.
6. **Menozi, C., 1927.** Zur Erforschung des Persischen Golfs (Beitrag nr. 12) Formicidae (Hym). *Supplementa Entomologica*. 16: 117-119.
7. **Tarbinsky, Y.S., 1976.** The ants of Kirghizia. Iiim Press, Frunze. 217 p.
8. **Terayama, M. and Choi, B.M., 1994.** Ant faunas of Taiwan, Korea and Japan. *Ari*. 17: 3-4.
9. **Ardeh, M., 1994.** Study on systematic and behavioral specialty of ants of Karaj region, Tehran University, Tehran. (In Persian)
10. **Paknia, A., 2012.** Investigation of the fauna and geographic distribution of female stinging ants and their health importance in Lar city (Lar city). Master's thesis. Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University. (In Persian)
11. **Paknia, O., Radchenko, A., Alipanah, H. and Pfeiffer, M., 2008.** Apreliminary checklist of the ants (Hymenoptera: Formicidae) of Iran. *Myrmecological News*. 11(11): 151-159.
12. **Parsa, S., 2013.** Fonestic study of ants in the western half of Mazandaran province. Master's thesis, Faculty of Basic Sciences, Tehran Azad University, North Branch. (In Persian)
13. **Aram, A., 2013.** Study of fauna and the dominant species of ants (Hymenoptera: Formicidae in Ardabil province, Khalkhal city, Khoresh Rostam district. Master's thesis. Faculty of Biology, Azad University, Tehran Medical Department. (In Persian)
14. **Ghahari, H. and Collingwood, C.A., 2013.** A study on the ants (Hymenoptera: Vespoidea: Formicidae) from western Iran. *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*. 48(1): 155-164. <https://doi.org/10.1556/A Phyt.48.2013.1.15>
15. **Ghahari, H., Tabari, M., Rashidi, A. and Mohebbi, H., 2010.** Investigation of fauna and population changes of ants (Hymenoptera: Formicidae) that hunt pests in Mazandaran rice fields. *Agroecology Journal*. 6(19): 61-70. (In Persian)
16. **Heydari Kia, V., 2015.,** Fonistic survey of ants of Qom province, Masters thesis, Shahid Beheshti University. (In Persian)
17. **Jafari, R., 2018.,** Fonistics study and abundance of ants (Hymenoptera: Formicidae) in Meshginshahr city and suburbs, Masters thesis, animal biosystematics, Shahid Beheshti University. (In Persian)
18. **Nafisi, R., 2013.,** Fonistics study and abundance of ants (Hymenoptera: Formicidae) in Sabzevar and Houmech city, Masters thesis, animal biosystematics, Shahid Beheshti University. (In Persian)
19. **Abolfathi, G., 20015.,** Fonistic and abundance survey (Hymenoptera: Formicidae) Boroujerd city, Lorestan province, Masters thesis, animal biosystematics, Islamic Azad University, Department of Medical Sciences, Tehran. (In Persian)