

**Research Article****Effect of Morphine administration on content of short-chain fatty acid of human gut microbiota****Mohammad Reza Barzegar<sup>1</sup>, Mohsen Zargar<sup>\*1</sup>, Seyed Davar Siadat<sup>2</sup>, Farzam Vaziri<sup>2</sup>, Razieh Nazari<sup>1</sup>**<sup>1</sup>Department of Microbiology, Faculty of science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran<sup>2</sup> Microbiology Research Center (MRC), Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran**Key Words**Morphine  
Drug addict  
Feces  
Microbiota  
Fatty acid**Abstract****Introduction:** In addition to mental and spiritual problems, drug addiction affects the addict's physical health. The digestive system is a key body system that contains plenty of opioid receptors, which makes it vulnerable to these compounds.**Materials & Methods:** The present study is an attempt to study the effects of morphine on short chain fatty acid levels produced by the intestine microbiota. 30 healthy individuals and 30 oral users of opium (for six years with a mean daily intake of 0.8 gr) were recruited. All the participants were men with a mean age of 40±3.9 years. The mean period of consuming drugs in the drug addicts was six years. After sampling feces of the participants, the level of fatty acids, including acetate, propionate, and butyrate were measured through gas chromatography-flame ionization detection.**Results:** The results indicated that compared to the healthy participants, the drug addict group had a significantly higher acetate (97.91 vs. 76.2), propionate (25.91 vs. 19.28), and butyrate (25.36 vs. 19.68) level (µm/g).**Conclusion:** In general, the results indicated that consuming morphine can affect production of short chain fatty acids. This can be attributed to the changes in microbiota of the digestive system of the consumers.**Article info****\* Corresponding Author's email:**  
[zargarmohsen2002@gmail.com](mailto:zargarmohsen2002@gmail.com)

Received: 29 March 2024

Reviewed: 3 May 2024

Revised: 6 July 2024

Accepted: 8 August 2024

## مقاله علمی - پژوهشی

## اثر مصرف مورفین بر محتوای اسیدهای چرب کوتاه زنجیر دستگاه گوارش انسان

محمدرضا بزرگر<sup>۱</sup>، محسن زرگر<sup>۲\*</sup>، سیدداور سیادت<sup>۲</sup>، فرزاد وزیری<sup>۲</sup>، راضیه نظری<sup>۱</sup><sup>۱</sup> گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران<sup>۲</sup> مرکز تحقیقات میکروبیولوژی (MRC)، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران

## چکیده

## کلمات کلیدی

**مقدمه:** اعتیاد علاوه بر ایجاد مسائل و مشکلات روحی و روانی برای فرد، می‌تواند سلامت انسان را نیز تحت تاثیر قرار دهد. دستگاه گوارش از جمله دستگاه‌های کلیدی موجود در بدن است که به دلیل دارا بودن گیرنده‌های فراوان اپیوئیدی به شدت تحت تاثیر این ترکیبات قرار می‌گیرد. این مطالعه با هدف بررسی اثر مورفین بر سطوح اسیدهای چرب کوتاه زنجیر تولید شده توسط میکروبیای روده انجام گرفت.

**مواد و روش‌ها:** برای این منظور از ۳۰ نفر فرد سالم و ۳۰ نفر فرد مصرف‌کننده خوراکی تریاک استفاده شد. تمام شرکت‌کنندگان مرد بودند و در بازه سنی  $30 \pm 9$  قرار داشتند. میانگین متوسط مدت زمان مصرف تریاک در افراد معتاد ۶ سال و میانگین متوسط مصرف روزانه تریاک ۰/۸ گرم بود. بعد از نمونه‌گیری از مدفوع شرکت‌کنندگان، اسیدهای چرب استات، پروپیونات و بوتیرات جداسازی (میکرومول بر گرم) و با تکنیک کروماتوگرافی گازی آشکارساز یونیزاسیون شعله سطوح آن‌ها سنجیده شد.

**نتایج:** نتایج نشان داد در گروه مصرف‌کننده خوراکی تریاک در مقایسه با گروه سالم، غلظت استات (۷۶/۲ در مقابل ۹۷/۹۱)، پروپیونات (۱۹/۲۸ در مقابل ۲۵/۹۱) و بوتیرات (۱۹/۶۸ در مقابل ۲۵/۳۶) به‌طور معنی‌داری بیش‌تر بود.

**بحث و نتیجه‌گیری:** به‌طور کلی نتایج به‌دست آمده از این مطالعه نشان داد که مصرف مورفین می‌تواند بر تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر روده تاثیر گذار باشد.

مورفین  
اعتیاد  
مدفوع  
میکروبیوتا  
اسیدچرب\* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:  
zargarmohsen2002@gmail.comتاریخ دریافت: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳  
تاریخ داوری: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳  
تاریخ اصلاح: ۱۶ تیر ۱۴۰۳  
تاریخ پذیرش: ۱۸ مرداد ۱۴۰۳

## مقدمه

متابولیت‌های تولید شده توسط میکروبیوتای دستگاه گوارش به انجام رسیده است. این مطالعه در این راستا و با هدف بررسی مقایسه میزان اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (SCFA=Short Chain Fatty Acid)، بوتیرات، استات و پروپیونات دستگاه گوارش افراد معتاد به مصرف مورفین نسبت به افراد سالم (غیرمعتاد) طراحی و به انجام رسید. نتایج به دست آمده از این مطالعه می‌تواند در بهبود سلامتی و کاهش عوارض مصرف مواد مخدر در افراد معتاد و در حال ترک از طریق طراحی رژیم‌های غذایی مناسب حاوی پروبیوتیک، پری‌بیوتیک، سایکوبیوتیک و اسیدهای چرب مناسب یا متابولیت‌های سازنده این اسیدهای چرب موثر باشد.

## مواد و روش‌ها

**جمعیت مورد مطالعه:** جمعیت مورد مطالعه این پژوهش متشکل از ۳۰ نفر مصرف‌کننده خوراکی تریاک و ۳۰ نفر افراد سالم بود. تمام شرکت‌کنندگان مرد و میانگین سن آن‌ها ۳۲/۹±۴۰ (حداقل ۳۵ و حداکثر ۴۵ سال) بود. افراد معتاد از لحاظ وضعیت اجتماعی، نوع مصرف، میزان مصرف و عدم ابتلا به بیماری در وضعیت مشابهی قرار داشتند. افراد سالم شرکت‌کننده در مطالعه نیز از لحاظ شاخص‌های سنی، اجتماعی و سلامتی شرایط یکسانی را داشتند. میانگین متوسط مدت زمان مصرف تریاک در افراد معتاد ۶/۱۷±۶/۱۴ (حداقل ۱ و حداکثر ۲۰ سال) بود. هم‌چنین میانگین متوسط مصرف روزانه تریاک توسط افراد معتاد ۰/۸۸±۰/۴۶ گرم (حداقل ۰/۳ و حداکثر ۲ گرم) بود.

**نمونه‌گیری و آماده‌سازی نمونه‌ها:** نمونه‌برداری از مدفوع شرکت‌کنندگان انجام گرفت. به این ترتیب که افراد شرکت‌کننده در ظرف جمع‌آوری مدفوع، نمونه مدفوع را ریخته و بعد از تحویل در سریع‌ترین زمان ممکن و با رعایت زنجیره سرد، نمونه‌ها به آزمایشگاه انتقال داده شدند و تا زمان انجام آزمایش در دمای ۷۰- نگه‌داری شدند. سنجش اسیدهای چرب کوتاه زنجیر به روش کروماتوگرافی گازی انجام گرفت (۱۴). برای این منظور ابتدا ۱۰۰ میلی‌گرم از نمونه مدفوع جمع‌آوری شده در یک میلی‌لیتر محلول NaCl اشباع (۳۶٪) معلق شد. سپس ۵۰ میکرولیتر محلول ۲ اتیل بوتریک اسید (2-Ethylbutyric acid, merck, Cas Number: 88-09-5) ۱۰.۷ میکرومولار (μM) به آن افزوده شد و نمونه‌ها همگن شدند. بعد از همگن شدن، به منظور جداسازی اسیدهای چرب ابتدا ۱۵۰ میکرولیتر اسیدسولفوریک ۹۶ درصد (H2SO4, merck, Cas Number: 7664-) و در ادامه ۳ میلی‌لیتر اتر (Ether, merck, Cas Number: 93-9) و در ادامه لایه اتر جدا و با افزودن ۱۵۰ میلی‌گرم سدیم سولفات (Na2SO4, merck, Cas Number: 60-29-7) به نمونه‌ها افزوده شد. در ادامه لایه اتر جدا و با افزودن

هر ساله در کشورهای مختلف هزینه‌های بسیاری صرف مبارزه با مواد مخدر یا درمان و نگهداری افراد وابسته به موادمخدر می‌شود. علاوه بر این، امروزه سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد به عنوان یک پدیده ویرانگر، در اغلب کشورها سرمایه‌های انسانی را به نابودی کشانده است (۱). به طوری که سازمان بهداشت جهانی مسئله مواد مخدر را در کنار سه مسئله جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی، آلودگی محیط‌زیست و فقر و شکاف طبقاتی قرار داده است. خسارات ناشی از مصرف مواد مخدر را می‌توان از وجوه مختلف روانشناسی، جامعه‌شناسی، اقتصادی و سیاسی مورد ارزیابی قرار داد. از دیدگاه پزشکی و سلامت نیز پدیده اعتیاد قابل بررسی و ارزیابی می‌باشد (۲). اثرات سوء مصرف مواد بر محور ایمنی-مغز و تاثیرگذاری آن بر سیستم ایمنی بدن به خوبی به اثبات رسیده است (۳، ۴، ۵). هم‌چنین مشاهده شده است استفاده طولانی مدت از ترکیبات اپیوئیدی می‌تواند عملکرد کبد را تحت تاثیر قرار دهد و ترکیب پروتئین‌های پلاسما را دستخوش تغییر نماید (۶). کشت سلول‌های کبدی در مجاورت مورفین، می‌تواند تولید گلیکوژن و آلبومین را تا ۵۰ درصد کاهش داد (۷). مصرف مورفین در دوره بارداری می‌تواند موجب تاخیر در رشد و تکوین جنین انسان شده و اختلال در تکامل سیستم عصبی را در پی داشته باشد (۸). هم‌چنین مصرف مورفین در موش تغییرات بافتی در تمام قسمت‌های روده باریک و بزرگ را به همراه دارد (۹). دستگاه گوارش یکی از دستگاه‌های فعال در بدن می‌باشد که با مجموعه متنوع و گسترده‌ای از میکروارگانیسم‌ها تحت عنوان میکروبیوتا از معده تا انتهای رکتوم کلونیزه شده است (۱۰). برآوردهای تقریبی نشان می‌دهند میکروبیوتای دستگاه گوارش انسان حاوی حدود ۱۰ تا ۱۰۰ تریلیون باکتری و سایر میکروارگانیسم‌ها است (۹). میکروبیوتا هم به طور مستقیم از طریق تعادل میکروبی دستگاه گوارش و هم به طور غیرمستقیم از طریق تولید متابولیت‌های ثانویه نظیر اسیدهای چرب کوتاه زنجیر بوتیرات، پروپیونات و استات نقش کلیدی در سلامت دستگاه گوارش، فعال نمودن سیستم ایمنی و فرآیند هضم و جذب مواد غذایی دارند (۲، ۱۱). عوامل ژنتیکی و محیطی نظیر سن، مصرف آنتی‌بیوتیک، عادات غذایی، استرس و تغییر حالت فیزیولوژیک می‌توانند بر تعداد و تنوع اجزای میکروبیوتا تاثیرگذار باشند (۱۲). اپیوئیدها به‌ویژه مورفین از جمله ترکیباتی هستند که می‌توانند میکروبیوتای دستگاه گوارش را تغییر داده و متعاقباً کمیت و کیفیت متابولیت‌های ثانویه تولید شده توسط آن‌ها را دستخوش تغییر نمایند (۱۳). براساس بررسی‌های انجام شده توسط نویسندگان، تاکنون مطالعات بسیار محدودی در زمینه اثر مورفین بر روی

استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶، روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی تحلیل شدند. سطح معنی‌داری کم‌تر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد ( $P < 0/05$ ).

## نتایج

مقایسه غلظت هر کدام از اسیدهای چرب بین دو گروه سالم و مصرف‌کننده خوراکی تریاک در جدول ۱ آورده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود اختلاف معنی‌داری بین دو گروه سالم و معتاد در غلظت اسیدهای چرب استخراج شده از مدفوع وجود دارد. به‌طوری که غلظت استات، پروپیونات و بوتیرات در گروه معتاد که دریافت روزانه تریاک به صورت خوراکی را داشتند در مقایسه با گروه سالم بیش‌تر بود.

6-82-7757 خشک شد. محلول به‌دست آمده (حدوداً ۰/۵ میکرولیتر) جهت شناسائی و تعیین مقدار اسیدهای چرب مورد مطالعه با تکنیک کروماتوگرافی گازی آشکارساز یونیزاسیون (Gas chromatography-Flame ionization detection (GC-FID)) شعله مورد آنالیز قرار گرفت. به منظور انجام کروماتوگرافی، از ستون تجزیه DB FFAP (Agilent) و گاز هلیوم به عنوان گاز حامل با جریان ثابت ۴/۲ میلی‌لیتر بر دقیقه استفاده شد. درجه حرارت اولیه آون به مدت ۳ دقیقه در ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم گردید، سپس هر دقیقه چهار درجه سانتی‌گراد افزایش یافت تا به ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد برسد. پس از ۵ دقیقه درجه حرارت هر دقیقه ۴۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یافت تا به ۲۳۵ درجه سانتی‌گراد برسد. در انتها کروماتوگرام‌های به دست آمده با استفاده از Chemstation پردازش شدند. غلظت‌های بوتیرات، استات و پروپیونات با استفاده از منحنی‌های کالیبراسیون به دست آمده از اندازه‌گیری استانداردهای خارجی محاسبه شد. غلظت‌های محاسبه شده به‌صورت میانگین  $\pm$  انحراف معیار ارائه شدند. داده‌ها با

جدول ۱: مقایسه غلظت اسیدهای چرب کوتاه زنجیر استات، پروپیونات و بوتیرات بین دو گروه سالم و معتاد

p-value	معتاد (میکرومول بر گرم)	سالم (میکرومول بر گرم)	
۰/۰۰۱	۹۷/۹۱±۳۲/۱۲	۷۶/۲۷±۱۲/۳۶	استات
۰/۰۱۳	۲۵/۹۱±۱۲/۸۸	۱۹/۲۸±۵/۱۷	پروپیونات
۰/۰۰۶	۲۵/۳۶±۹/۴۹	۱۹/۶۸±۵/۲۲	بوتیرات

محافظة در برابر التهاب، توسعه صحیح و حفظ سد خونی مغزی و بهبود عملکرد سیستم ایمنی اشاره کرد (۷، ۸). میانگین تولید SCFA تقریباً ۶۰۰-۵۰۰ میلی‌مول در روز است که فاکتورهای متعددی نظیر محتوای فیبر رژیم غذایی، زمان انتقال مواد غذایی به روده بزرگ، ترکیب میکروبیوتای روده و حضور ترکیبات دارویی و سایر عوامل می‌توانند این سطح تولید را دستخوش تغییر نمایند (۱۶). اپیوئیدها به‌ویژه مورفین از جمله ترکیباتی هستند که با تاثیرگذاری بر روی جمعیت میکروبیوتای روده می‌توانند سطح کمی و کیفی تولید SCFA را تحت تاثیر قرار دهند (۱۳). دستگاه گوارش بعد از دستگاه عصبی دارای بیش‌ترین میزان گیرنده‌های اپیوئیدی در بدن است که نشان دهنده تاثیرپذیری بالای آن از این ترکیبات است (۱۴). هدف از انجام مطالعه حاضر مقایسه سطح تولید SCFA در افراد سالم و مصرف‌کننده مورفین به صورت خوراکی بوده است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف نرمال بودن غلظت‌های به دست آمده از هر سه اسیدچرب در هر گروه مورد تأیید قرار گرفت. براساس جستجوی نویسندگان، تاکنون مطالعات بسیار محدودی تاثیر مصرف مورفین را بر روی تعادل میکروبی و تولید کمی و کیفی اسیدهای چرب روده در انسان مورد بررسی قرار داده‌اند. در مطالعه‌ای بر روی

## بحث

اسیدهای چرب کوتاه زنجیر اسیدهای مونوکربوکسیلیک آلی کوچک با طول زنجیره تا ۶ اتم کربن می‌باشند و محصول اصلی حاصل از فعالیت تخمیری هوازی میکروبیوتای روده بزرگ بر روی پلی ساکاریدهای غیرقابل هضم مانند فیبر غذایی و نشاسته مقاوم هستند (۱۰). بخش اعظم این اسیدهای چرب را استات (C<sub>2</sub>)، پروپیونات (C<sub>3</sub>) و بوتیرات (C<sub>4</sub>) با نسبت ۶۰، ۲۰ و ۲۰ تشکیل می‌دهند. الیاف بزرگ‌ترین منبع تولید این اسیدهای چرب می‌باشند، با این وجود امکان تولید آن‌ها از اسیدهای آمینه نیز مقدور است. با این حال، کم‌تر از ۱٪ از میکروبیوتای روده بزرگ از این مسیر برای تولید آن‌ها استفاده می‌کنند (۱۱). SCFA به آسانی توسط سلول‌های اپیتلیال کولون جذب و متابولیزه می‌شوند لذا تنها بخش کوچکی از این اسیدهای چرب وارد سیستم گردش خون عمومی می‌شوند. میزان جذب پروپیونات و بوتیرات در مقایسه با استات بیش‌تر است لذا امکان متابولیزه شدن آن‌ها در روده نیز افزایش می‌یابد (۱۵). در مطالعات مختلف نقش‌های متعددی برای SCFA بیان شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تامین سلامت و انرژی سلول‌های روده، حفظ یکپارچگی سد روده‌ای، تولید مخاط،

- before injection. *Journal of Animal Environment*. 8(2): 47-52. (In Persian)
6. **Shavakhy, A., Sadeghi, A.R. and Minakary, M., 2010.** Opium Consumption and Risk of Liver Fibrosis in Chronic Hepatitis B and C. *Journal of Isfahan Medical School*. 28(110): 19-25. (In Persian)
  7. **Lewis, K., Lutgendorff, F., Phan, V., Söderholm, J.D., Sherman, P.M. and McKay, D.M., 2010.** Enhanced translocation of bacteria across metabolically stressed epithelia is reduced by butyrate. *Inflammatory bowel diseases*. 16(7): 1138-1148. doi: 10.1002/ibd.21177
  8. **Gaudier, E., Rival, M., Buisine, M.P., Robineau, I. and Hoebler, C., 2009.** Butyrate enemas upregulate Muc genes expression but decrease adherent mucus thickness in mice colon. *Physiological research*. 58(1): 111-119. doi: 10.33549/physiolres.931271
  9. **Habibian, S., Zamani Ahmadmoodi, M., Shadkhast, M., Khaksar, E., Rashidi, M. and Ziaei, B., 2011.** Effect of Chronic Administration of Opioids (Morphine) on Growth and Intestinal Mucosa in Mouse Strain Balb/c. *Veterinary Research (Gar Branmsar Branch)*. 6: 176-181.
  10. **Machado, M.G., Sencio, V. and Trottein, F., 2021.** Short-chain fatty acids as a potential treatment for infections: a closer look at the lungs. *Infection and Immunity*. 89(9): e0018821. doi: 10.1128/IAI.00188-21
  11. **Luu, M., Pautz, S., Kohl, V., Singh, R., Romero, R. and Lucas, S., 2019.** The short-chain fatty acid pentanoate suppresses autoimmunity by modulating the metabolic-epigenetic crosstalk in lymphocytes. *Nature communications*. 10(1): 1-12. doi: 10.1038/s41467-019-08711-2
  12. **Dehghani, S., Rostami, R. and Aslani, S., 2017.** Addiction in adolescents: A review on neurological concepts. *Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal (RRJ)*. 6(3): 115-134. (In Persian)
  13. **Barengolts, E., Green, S.J., Eisenberg, Y., Akbar, A., Reddivari, B. and Layden, B.T., 2018.** Gut microbiota varies by opioid use, circulating leptin and oxytocin in African American men with diabetes and high burden of chronic disease. *PLoS One*. 13(3): 171-194. doi: 10.1371/journal.pone.0194171
  14. **Wang, F. and Roy, S., 2017.** Gut homeostasis, microbial dysbiosis, and opioids. *Toxicologic pathology*. 45(1): 150-156. doi: 10.1177/0192623316679898
  15. **Schönfeld, P. and Wojtczak, L., 2016.** Shortand medium chain fatty acids in energy metabolism: the cellular perspective. *Journal of lipid research*. 57(6): 943-954. doi: 10.1194/jlr.R067629
  16. **Macfarlane, S. and Macfarlane, G.T., 2003.** Regulation of short-chain fatty acid production. *Proceedings of the Nutrition Society*. 62(1): 67-72. doi: 10.1079/PNS2002207
  17. **Thomas, K.R., Watt, J., Wu, C.M.J., Akinrinoye, A., Amjad, S. and Colvin, L., 2022.** Pain and Opioid-Induced Gut Microbial Dysbiosis. *Biomedicines*. 10(8): 1815. doi: 10.3390/biomedicines10081815
  18. **Börnigen, D., Morgan, X.C., Franzosa, E.A., Ren, B., Xavier, R.J. and Garrett, W.S., 2013.** Functional profiling of the gut microbiome in disease-associated inflammation. *Genomemedicine*. 5(7): 1-13. doi: 10.1186/gm469
  19. **Cho, I., Yamanishi, S., Cox, L., Methé, B.A., Zavadil, J. and Li, K., 2012.** Antibiotics in early life alter the murine colonic microbiome and adiposity. *Nature*. 488(7): 621-626. doi: 10.1038/nature11400
  20. **Kim, H.B., Borewicz, K., White, B.A., Singer, R.S., Sreevatsan, S. and Tu, Z.J., 2012.** Microbial shifts in the swine distal gut in response to the treatment with anti microbial growth promoter, tylosin. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 109(38): 15485-15490. doi: 10.1073/pnas.1205147109
- موش نشان داده شد افزایش غلظت مورفین (۱ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) تاثیر معنی داری بر افزایش غلظت اسیدهای چرب پروپیونات و بوتیرات نداشت. غلظت استات تحت تاثیر غلظت مورفین قرار گرفت با این وجود این ارتباط خطی نبود. به طوری که با افزایش غلظت میزان مورفین (۳ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) استات افزایش یافت ولی با افزایش غلظت مورفین غلظت استات روند کاهشی نشان داد (۱۴). نتایج این مطالعه با نتایج به دست آمده از مطالعه اخیر هم خوانی ندارد. گونه و مدت زمان مصرف مورفین می تواند از جمله دلایل احتمالی این تفاوت باشد. در این مطالعه میانگین زمان مصرف تریاک ۶ سال بوده است در صورتی که در این مطالعه و بعضاً سایر مطالعات زمان مصرف مورفین محدود بوده و بیش تر از جنبه دارویی به آن نگریسته شده است. از آن جایی که منشاء تولید SCFA جمعیت میکروبی روده است لذا این احتمال وجود دارد که تفاوت مشاهده شده بین نتایج مطالعات مختلف ناشی از تفاوت در کمیت و کیفیت جمعیت میکروبی باشد. گزارش شده است مصرف مواد اپیوئیدی نظیر مورفین به عنوان مسکن ممکن است منجر به بروز علائم نامطلوب گوارشی گردد (۱۷). هم چنین گزارش شده است استفاده از مورفین با کاربرد دارویی، جایابی باکتری های روده را به همراه داشته است (۱۸). در مطالعه دیگری اثر طولانی مدت مصرف آنتی بیوتیک (دوزهای پائین تر از دوز درمان) در موش و خوک نشان داد تغییرات عمیق در میکروبیوم روده می تواند باعث افزایش فراوانی SCFA شود (۱۹، ۲۰). علی رغم وجود گزارشات متنوع و بعضاً با نتایج متناقض هنوز مشخص نیست که چگونه درمان با مورفین ترکیب و فراوانی متابولیت های روده را تعدیل می کند.

## منابع

1. **Esmaili, N.A., Khodadadi, A. and Sayadi, A.A.R., 2004.** The effect of narcotics on blood sugar, triglycerides and cholesterol in drug-dependants. *Journal of Sabzevar University of Medical Sciences*. 10(4): 13-19. (In Persian)
2. **Mohammadi, A., Darabi, M., Nasry, M., Saabet Jahromi, M.J., Malek-Pour-Afshar, R. and Sheibani, H., 2009.** Effect of opium addiction on lipid profile and atherosclerosis formation in hypercholesterolemic rabbits. *Experimental and toxicologic pathology*. 61(2): 145-149. doi: 10.1016/j.etp.2008.08.001
3. **Plein, L.M. and Rittner, H.L., 2018.** Opioids and the immune system—friend or foe. *British journal of pharmacology*. 175(14): 2717-2725. doi: 10.1111/bph.13750
4. **Bagheripoor, M., Khazali, H., Mahmoudi, F. and Samiee, K., 2018.** The effects of morphine sulphate on hypothalamic glutamate levels and serum LH hormone concentration in male rats. *Journal of Animal Environment*. 10(2): 45-50. (In Persian)
5. **Haghnazari, F., Khazali, H. and Taghvimi, S., 2016.** Galanin or morphine significantly decreased thyroid hormones concentration after injections compared to